



APILIFE VAR® ist ein apothekenpflichtiges Veterinärprodukt.

Zulassungsinhaber:

Chemicals Laif srl
35010 Vigonza (PD) - Italy
Viale dell'Artigianato, 13
Tel. + 39 049 626281
Fax + 39 049 628501
e-mail: info@chemicalslaif.it
www.chemicalslaif.it

Handelsform:
Beutel mit 2 Verdunstungstafeln



Wir vertreiben unsere Produkte in:

- ITALIEN, FRANKREICH ,
- DEUTSCHLAND, GROSSBRITANNIEN,
- GRIECHENLAND, ÖSTERREICH,
- UNGARN, POLEN, RUMÄNIEN,
- SCHWEIZ, ALBANIEN,
- BOSNIEN-HERZEGOWINA,
- MOLDAWIEN, TÜRKEI, LYBIEN,
- IRAN, MAROKKO, LIBANON, SYRIEN,
- NEUSEELAND, USA, URUGUAY,
- CHILE, KUBA....

EXKLUSIVVERTRIEB für die Bundesrepublik Deutschland durch:
Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b
06406 Bernburg
Telefon: 0 34 71/ 860- 401
Telefax: 0 34 71/ 860- 408
Email: veterinaer@serumwerk.de

ApilifeVar®

BIOLOGISCH, SICHER, EFFEKTIV



GEGEN
VARROA



PRODUKTINFORMATION:

BIOLOGISCHE LÖSUNG

APILIFE VAR® basiert auf 4 AKTIVEN INHALTSSTOFFEN (**Thymol, Eukalyptusöl, Menthol und Kampfer**). Das Präparat wird für die Behandlung gegen die Varroamilbe (*Varroa destructor*) bei Bienen eingesetzt. **APILIFE VAR®** ist ein auf natürlicher Basis wirkendes Produkt – alle Inhaltsstoffe kommen auch in der Pflanzenwelt vor.

Anhand des hohen Gehaltes an ätherischen Ölen (Wirkungskonzentration) in der Stockluft, übt **APILIFE VAR®** eine vertreibende aber auch bekämpfende Wirkung aus. Der Behandlungserfolg ist anhand der in den Bodeneinlagen liegenden, abgefallenen Milben ablesbar.

KEINE ARZNEIMITTELRESISTENZEN

Im Gegensatz zu anderen chemischen Syntheseprodukten (**Pyrethroiden**, Organophosphorverbindungen, Amiden und anderen) wurden bei **APILIFE VAR®** bisher keine Arzneimittelresistenzen beobachtet.

ANWENDUNGSSICHERHEIT

Alle Komponenten sind absolut unbedenklich für den Verbraucher, die Bienen und alle Produkte des Bienenstocks. Alle Inhaltsstoffe sind in der Anlage II der EC

Vorschrift Nr. 2377/90 gelistet, welche unproblematische Substanzen umfasst, für die eine Höchstmengenregelung (MRL) nicht für notwendig erachtet wird. Dementsprechend gibt es für Honig keine Höchstmengenbegrenzung. Die Nutzung von **APILIFE VAR®** schließt somit jegliche Rückstandsproblematik im Honig und anderen Produkten des Bienenstocks aus.

Wartezeit für Honig: 0 Tage

BIOLOGISCHE IMKEREI

Dank seiner natürlichen und sicheren Komponenten, ist **APILIFE VAR®** ohne jegliche Limitierungen bei der Regulierungsbehörde für biologische Imkerei, für die Bekämpfung der Varroose registriert (Reg. 2092/91/EEC vom 24. Juni 1991).

NUTZUNGSPERIODE:

Die optimale Nutzungsperiode ist abhängig von den klimatischen Bedingungen der jeweiligen Länder. Im Allgemeinen wird eine Nutzung während der warmen Jahreszeit (Spätsommer), direkt nach der Honigernte empfohlen.

Die Idealtemperaturen für Behandlungen mit **APILIFE VAR®** liegen zwischen 20 °C und 25 °C. Die spezielle Mischung der Inhaltsstoffe ermöglicht eine optimale Verdunstung innerhalb des Bienenstocks auch dann, wenn die jahreszeitlichen

Durchschnittstemperaturen niedriger sind.


NUTZUNGSHINWEISE:

- Alle Bienenvölker in einem Bestand sollten gleichzeitig und am besten in den Abend hinein behandelt werden.
- Es sollten nur starke bzw. stark eingewinterte Völker behandelt werden.
- Das Einbringen des Produktes in den Bienenstock sollte am späten Nachmittag in den Abend hinein erfolgen. Bei schlechtem Wetter kann das Einlegen des Präparates den ganzen Tag über erfolgen.
- Ein Behandlungsstart bei Temperaturen über 30 °C sollte vermieden werden.
- Eine hohe Wirkung wird nur bei Völkern mit Brut erreicht.
- Keine Anwendung während der Tracht oder mit vollen Honigräumen.
- Mit Ausnahme der Restentmilbung im Winter sind keine zusätzlichen Behandlungen notwendig.
- Die Anwendung des Produktes erfolgt auf den Rähmchenoberträgern über dem Bienensitz.
- Die angegebene Dosierung sollte nicht überschritten werden.
- Nicht gleichzeitig mit anderen Varroaziden anwenden.
- Es ist keine Schutzkleidung erforderlich. Leichte Schutzhandschuhe sollten jedoch verwendet werden.

EFFEKTIVITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Langjährige Erfahrungen in der imkerlichen Praxis sowie zahlreiche internationale Studien belegen die hohe Effektivität von **APILIFE VAR®**. Der Wirkungsgrad liegt im Rahmen der Varroabekämpfung bei über 90 %.

Wirksamkeit von API LIFE VAR



TIPPS ZUR ANWENDUNG VON APILIFE VAR®:

Feldstudien haben eine hohe Wirksamkeit gezeigt, wenn das Produkt wie folgt angewendet wurde...

1

Die Völker auf den Wintersitz bringen (2-zargig oder 1-zargig).

2

Die Völker rasch auffüttern (eventuell vorher schon Mäusekeile anbringen, Gitterböden verschließen) und 4 – 5 Tage abwarten.

3

Bei 2-zargigen Völkern die beiden Verdunstungstafeln einer Tüte entnehmen und diagonal auf die Rähmchenoberträger legen; bei 1-zargigen Völkern nur eine Verdunstungstafel entnehmen, zerbrechen und beide Teile ebenfalls diagonal auf die Rähmchenoberträger auflegen. Um direkten Kontakt mit dem Produkt zu vermeiden, sollten die Verdunstungstafeln auf kleine Gitter aufgelegt werden (siehe Bild). Die Gitter müssen regelmäßig kontrolliert werden.

4

Nach etwa 2 – 3 Wochen die zweite Serie Verdunstungstafeln diagonal versetzt dazulegen.

5

Verdunstungstafeln frühestens nach 6-wöchiger Behandlung wieder herausnehmen.